


BOLETIN EPIDEMIOLOGICO VIH

La infección por el virus del VIH afecta actualmente a más de 34 millones de personas a nivel mundial, sobre todo en países en vía de desarrollo, de éstos el 9% son niños que contrajeron la infección a través de sus madres ya sea dura el embarazo, el parto o por lactancia materna (1). En nuestro medio la transmisión perinatal de VIH es baja gracias al tratamiento oportuno de la madre durante el embarazo, sin embargo se presentan dificultades con aquellas mujeres habitantes de calle en las cuales el diagnóstico puede ser tardío.


Se presenta la situación de VIH en Risaralda tomando como fuente de información SIVIGILA: A la semana 30 de 2013 se han diagnosticado en el departamento 149 casos de VIH. Comparado con el mismo período del 2012, la notificación se ha aumentado en 12 casos. La distribución de acuerdo al período epidemiológico se muestra en la siguiente gráfica:




Se observa la mayor notificación en el segundo período con 35 casos mientras que para el octavo período el número de casos disminuyó a 4.

De los 149 casos el 30% corresponde a mujeres es decir, 45 casos, y de éstas 9 se notificaron como embarazadas, dos de ellas en el primer trimestre, cinco en el segundo y dos en el tercer trimestre.

La distribución por grupos de edad y sexo se muestra en la siguiente gráfica



Se observa que no hubo diferencias en el grupo de edad de 16 a 20 años, pero en los demás grupos predomina el sexo masculino, excepto en menores de 1 año y en el grupo de 11 a 15 años donde hay un caso respectivamente. Hay un caso de transmisión perinatal. El evento predomina en las cabeceras municipales con el 77% de los casos y sólo un 7% de ellos se reportan en área rural dispersa



Teniendo en cuenta el régimen e afiliación, el 51% de los casos pertenecen al régimen subsidiado, el 33% al régimen contributivo, 14% son no afiliados.

A la semana 30 se han reportado 8 muertes por este evento, 7 hombres y una mujer.

De acuerdo al mecanismo probable de transmisión, predomina el heterosexual, en el 74% de los casos, el 30% corresponde a transmisión homosexual, el 3% a bisexual y 0.6% a perinatal y accidente laboral.

El evento se ha notificado en 8 municipios del departamento.

Actualmente el municipio con mayor riesgo es la Virginia con una incidencia de 2.8 por cada 10.000 habitantes, seguido por Pereira con 2 casos por 10.000 habitantes, mientras que Santa Rosa y

Marsella presentan actualmente las incidencias más bajas en el municipio como se muestra en la siguiente tabla.

VIH Incidencia acumulada. Risaralda semana 30 de 2013

MUNICIPIO	CASOS	POBLACION	IA
LA VIRGINIA	9	31886	2.8
PEREIRA	94	464719	2.0
APIA	3	18692	1.6
DOSQUEBRADAS	31	194976	1.6
BALBOA	1	6332	1.6
LA CELIA	1	8632	1.2
SANTA ROSA	8	71810	1.1
MARSELLA	2	22908	0.9

BROTES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

Desde hace tres semanas el municipio de Santuario se encuentra en situación de brote de varicela. Los primeros afectados fueron 18 niños del hogar infantil comunitario, posteriormente se reportaron tres casos en estudiantes del colegio María Auxiliadora y van ocho casos reportados en adultos. Se realizó visita de acompañamiento al municipio, además se visitó tanto el hogar infantil como el colegio María Auxiliadora con el fin de dar información relevante a los docentes sobre la enfermedad y las medidas de higiene necesarias para evitar el contagio para que sean ellos los que repliquen esta información. Además se insistió en los días de incapacidad tanto escolar como laboral necesaria para cortar la cadena de transmisión.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD¹⁰ datos sobre el VIH/SIDA. Diciembre de 2012

